


Аденома простаты – заболевание, которое сопровождается наличием доброкачественной опухоли



в тканях предстательной железы. Сегодня, более 50 % мужчин в возрасте от 50-55 лет страдают данным заболеванием.

Наиболее распространенные симптомы аденомы простаты:

- Постоянное чувство заполненного мочевого пузыря;
- Учащенные позывы к мочеиспусканию в любое время суток;
- Слабый, довольно тонкий напор струи;
- Для начала процесса мочеиспускания необходимо дополнительно напрячь мышцы.

Диагностика аденомы простаты:

- Ректальный пальцевой осмотр;
- Лабораторные исследования «больной» железы, в том числе исследование, таких показателей, как ПСА (специальный простатспецифический антиген);
- Исследования уродинамического характера инструментальными методами – это методы замера потока мочи, которые позволяют определить уровень нарушения и характер мочеиспускания.

Лечение данного урологического заболевания

Лечение может быть, как стационарным, так и амбулаторным, в зависимости от возникших осложнений и фазы болезни.

На ранней стадии используют преимущественно медикаментозный метод лечения, то

есть с помощью различных лекарств:

- Препараты растительного происхождения;
- Для уменьшения величины железы – различные гормональные препараты;
- Для облегчения мочеиспускательного процесса – влияющие на тонус «больной» простаты и канала.

На поздних стадиях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Хирургическое вмешательство

Наиболее популярным, эффективным и менее болезненным является лечение аденомы простаты при помощи лазера. Проводится такое лечение с помощью лазера и эндоскопа. Лазерная хирургия производится сквозь внешнее отверстие уретры, располагающееся на верху полового члена.

На сегодняшний день, применяют различные методики лазерного лечения:

- HoLAP– лазерная гольмиевая абляция простаты;
- [Удаление аденомы простаты](#) лазером – лазерная абляция;
- Удаление аденомы целиком – лазерная энуклеация.

Главным преимуществом лазерной хирургии является быстрое восстановление и высокая эффективность. Единственное, что в первое время может беспокоить пациента, так это мочи недержание, наличие крови в моче в течение нескольких дней.

Что касается цены операции, то она напрямую зависит от того, каким методом ее будут проводить, а также от размеров «больной» простаты. Сколько стоит лазерное удаление аденомы простаты можно будет узнать у специалиста после консультации.

Операция при помощи лазера помогает достичь превосходных результатов при лечении аденомы простаты, а так же замедлить ее рост. Лазер до минимума снижает все побочные эффекты и неприятные ощущения, такие как частое мочеиспускание, боль, позывы к мочеиспусканию в ночное время и прочие.

Существуют и другие виды операций при аденоме простаты:

- ТУР-операция (трансуретральная резекция) аденомы простаты. Во время операции через уретру эндоскоп проникает к «больной» железе. При помощи специального инструмента проделывается довольно широкий канал для нормального прохождения мочевой жидкости. Данное хирургическое вмешательство выполняется под спинальным или общим наркозом. Госпитализируется пациент на 1-2 дня.
- Открытая простатэктомия – довольно травматичная процедура и, на сегодняшний день, выполняется только в 2-3 % случаях, когда провести другим способ операции нет возможности.